



Gemeinschaftspraxis
Dr. med. Peter Geyer/ Dr. med. Marco Krenzer

Bahnhofstr. 16 - 36037 Fulda
Tel.: 0661/38092-0 Fax: 0661/38092-29

Informationsblatt für Patienten zur Darmspiegelung
Vorbereitung mit Eziclen


Ihr Untersuchungstermin ist am um Uhr

Eine ausreichende Darmreinigung ist Voraussetzung für das Gelingen der Untersuchung. Sie liegt dann vor, wenn der Darminhalt in der Toilette völlig klar und allenfalls noch leicht gelblich gefärbt erscheint.


Wichtig: Bitte verzichten Sie **1 Woche vor der Darmspiegelung** auf alle **Körnerprodukte** wie z.B. Müsli, Körnerbrot, Tomaten, Paprika, Obst mit Kernen, Salat, Kümmel!
Bitte **3 Tage** vor der Untersuchung keinen Salat essen.

Vortag der Untersuchung:


Bis 10:00 Uhr	<ul style="list-style-type: none">• normal frühstücken
Bis 12:00 Uhr	<ul style="list-style-type: none">• leichtes, fettarmes Mittagessen (keine schwer verdaulichen Speisen)• ab jetzt keine festen Speisen mehr
Um 15:00 Uhr	<ul style="list-style-type: none">• die erste EZICLEN-Dosis einnehmen (wie rechts beschrieben) Dauer der Einnahme 45 Minuten• ½ Stunde warten, dann weitere 2-3 Liter trinken (siehe erlaubte Flüssigkeiten)



1 Gießen Sie den Inhalt einer Flasche EZICLEN in den Becher.



2 Fügen Sie der Arznei Wasser hinzu, bis die Markierung am Becher erreicht ist.



3 ½ - 1 Std. Lassen Sie sich Zeit (**mehr als eine halbe bis zu einer Stunde**), um die gesamte Flüssigkeit im Becher zu trinken.

Untersuchungstag:

4 Std. vorher	<ul style="list-style-type: none">• die zweite EZICLEN-Dosis einnehmen (wie rechts beschrieben)• ½ Stunde warten, dann weitere 2-3 Liter trinken (siehe erlaubte Flüssigkeiten)
----------------------	---



Folgende klare Flüssigkeiten dürfen Sie trinken:

Klare Flüssigkeiten wie Wasser, Tee oder Kaffee (ohne Milch oder Kaffeeweißer). Süßungsmittel sind erlaubt; sprudelnde (kohlenensäurehaltige) oder stille (kohlenäurefreie) Erfrischungsgetränke, gefilterte Fruchtsäfte **ohne** Fruchtfleisch (nicht rot oder purpurfarben), klare Suppen oder durchgeseibte Suppen ohne Feststoffe.



Folgende Flüssigkeiten dürfen Sie NICHT trinken:

Milch, rote oder purpurfarbene Flüssigkeiten, alkoholische Getränke, Fruchtsäfte oder Erfrischungsgetränke mit Fruchtfleisch.

Wichtig:

Falls Sie eine Betäubung erhalten haben, müssen Sie von einer Begleitperson abgeholt werden.

Dies gilt ohne Ausnahme für jeden Patienten!!!

Wir bitten Sie, den Aufklärungsbogen und ein größeres Handtuch zum Zudecken mitzubringen.